

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΚΩΝ. ΦΡΑΝΤΖΙΔΗ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Γ.

Κύπριος γιατρός φέρνει στην Κύπρο μια νέα επαναστατική τεχνική

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΤΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ
ΚΥΣΤΕΩΣ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΖΕΡ**

• Του Παναγιώτη
Χ. Δημητρίου

ΟΚΥΠΡΙΟΣ χειρουργός Κωνσταντίνος Φραντζίδης που διαπρέπει στην Αμερική, θα φέρει στην Κύπρο την καινούργια επαναστατική τεχνική για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως με τη χρήση των λέιζερ, όπως είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην «Ε.Τ.Γ.».


Η καινούργια τεχνική ονομάζεται λαπαροσκοπική λέιζερ χολοκυστεκτομή και είναι σύμφωνα με τον Δρ. Φραντζίδα που βρίσκεται πρόφορα στην Κύπρο, η λιγότερο τραυματική και επώδυνη σε σύγκριση με την συμβατική χολοκυστεκτομή. Η νέα μέθοδος απαιτεί μόνο τρεις μικρές παρακентήσεις, δύο στο δεξιό μέρος της κοιλιάς και μια μικρή τομή στον ομφαλό. Μέσω της τομής του ομφαλού εισάγεται μικρό τηλεσκόπιο (λαπαροσκόπιο) το οποίο συνδέεται με δύο οθόνες τηλεοράσεων. Ο χειρουργός εκτελεί την χειρουργική επέμβαση βλέποντας το εσωτερικό της κοιλιάς στις οθόνες των τηλεοράσεων που μεγεθύνουν την εικόνα κατά είκοσι φορές. Ο χειρουργός απελευθερώνει την Χοληδόχο κύστη από το συκώτι με την βοήθεια των λέιζερ. Τελικά

την αφαιρεί μέσω του ομφαλού. Οι ασθενείς που χειρουργούνται με αυτή τη μέθοδο έχουν γρήγορη και ανώδυνη ανάρρωση και επιπλέον δεν έχουν σχεδόν καθόλου μετεγχειρητικές ουλές. Είκοσι εκατομμύρια περίπου Αμερικανών, όπως μας ανέφερε ο Δρ. Φραντζίδης, υποφέρουν από χολολιθίαση και εκτελούνται κατά μέσο όρο μισό εκατομμύριο χολοκυστεκτομές το χρόνο, δίνοντας στην καινούργια αυτή τεχνική έναν ξεχωριστό ρόλο.

Η καινούργια αυτή επαναστατική τεχνική αλλάζει εντελώς την χειρουργική αντιμετώπιση της χολολιθίασης. Τονίζει όμως, ο Δρ. Φραντζίδης, ότι η επέμβαση αυτή θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα μόνο από χειρουργούς εκπαιδευμένους σε ειδικό πανεπιστημιακό κέντρο που διδάσκουν την τεχνική της λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με τη χρήση λέιζερ.

Το βασικότερο της νέας μεθόδου είναι ότι οι ασθενείς που χειρουργούνται με αυτό τον τρόπο έχουν πολύ λίγο πόνο και φεύγουν από το νοσοκομείο ή την κλινική λίγες ώρες μετά την εγχείρηση. Οι περισσότεροι δε, μπορούν να γυρίσουν στη δουλειά τους σε μια βδομάδα. Αντίθετα, η αυνηθισμένη χολοκυστεκτομή απαιτεί μεγάλη τομή και παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 5-6 μέρες και 4-6 βδομάδες για ανάρρωση. Ο Δρ. Φραντζίδης που είναι καθηγητής χειρουργικής στο Ιατρικό Κολλέγιο του Γεωργίου στην ΗΠΑ,

διδάσκει σε χειρουργούς τη νέα μέθοδο. Επίσης σαν επικεφαλής ομάδας χειρουργών πραγματοποιεί χειρουργικές επεμβάσεις στο νοσοκομείο του Κολλεγίου με πλήρη επιτυχία. Από την Κύπρο πήγε στην



Αθήνα όπου ήταν προκεκλημένος του Νοσοκομείου Ευαγγελισμού για να πραγματοποιήσει σειρές εγχειρήσεων και παράλληλα να διδάξει σε Έλληνες χειρουργούς τη νέα μέθοδο. Στην ιδιαίτερη του πατρίδα Κύπρο, όπως μας

είπε, θα έρθει το επόμενο καλοκαίρι αν όλα πάνε καλά φέρνοντας μαζί του όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται για να κάνει τις εγχειρήσεις χολής με τη νέα μέθοδο. Τις εγχειρήσεις θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν ο ιατρικός κόμμας της Κύπρου

Οι Κύπριοι χειρουργοί συνέχισε ο Δρ. Φραντζίδης, είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν στο πανεπιστήμιο που διδάσκει όπου με μεγάλη μου χαρά θα τους εκπαιδεύσω στη νέα μέθοδο. Η καινούργια μεθοδος

εφαρμόζεται μέχρι στιγμής στην Αμερική και σε μικρότερο βαθμό στη Γερμανία και Γαλλία. Ο Δρ. Κώστας Φραντζίδης κατάγεται από την Ευρύχου, μεγάλωσε όμως στη Λεμεσό.

**ΠΑΡΑ-
ΣΚΗΝΙΟ**
από τον
**Αθηναϊκό
Τύπο**